MINOXIDIL 2% et 5%

Solution pour application locale

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION

Minoxidil 2% :

Minoxidil ..... 20 mg

Excipients : propylèneglycol, alcool éthylique, eau purifiée ..... q.s.p . 1 ml

Minoxidil 5% :

Minoxidil ..... 50 mg

Excipients : propylèneglycol, alcool éthylique, eau purifiée ..... q.s.p . 1 ml

FORMES ET PRESENTATIONS

- Solution pour application locale dosée à 2 % en minoxidil :
  - Flacon de 120 ml en verre brun avec pulvérisateur et pipette graduée.
  - Coffret de 2 flacons de 120 ml en verre brun avec pulvérisateur et pipette graduée.
- Solution pour application locale dosée à 5 % en minoxidil :
  - Flacon de 120 ml en verre brun avec pulvérisateur et pipette graduée.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antialopécique topique (D : dermatologie)

INDICATIONS

Le Minoxidil est indiqué en cas de chute de cheveux modérée (alopécie androgénétique) de l'adulte, homme ou femme. Il favorise la pousse des cheveux en stimulant la croissance des kératinocytes et stabilise le phénomène de chute.

Le Minoxidil 5%, forme plus concentrée, est réservé aux patients n'ayant pas répondu au Minoxidil 2% après 4 mois de traitement bien conduit.

ATTENTION !

CONTRE INDICATIONS

- Allergie connue au minoxidil, au propylèneglycol ou à l'éthanol.
- Sujets âgés de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans (l'efficacité et la tolérance n'ayant pas été étudiées).
- Cuir chevelu pathologique.
- Pour le Minoxidil 5%, en cas de mauvaise tolérance à la forme 2% quelle que soit la symptomatologie.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Mises en garde

- Le Minoxidil 5% n'est pas recommandé chez la femme en raison de la fréquence importante des hypertrichoses à distance
- Le Minoxidil ne doit être appliqué que sur un cuir chevelu normal et sain : absence de dermatose ou de lésion du cuir chevelu, sinon risque d'effets systémiques.
- Le Minoxidil ne doit pas être utilisé en cas d'application concomitante d'acide rétinoïque, d'anthraline ou de tout autre topique irritant,
- La posologie et le mode d'administration doivent être impérativement respectés sinon des effets systémiques liés à une variabilité individuelle ou une sensibilité inhabituelle ne peuvent être exclus (baisse de la pression artérielle, tachycardie, signes de rétention hydrosodée, douleur thoracique)
- En cas d'apparition d'effets systémiques ou de réactions dermatologiques sévères, le traitement doit être interrompu et le médecin traitant prévenu,
- Le Minoxidil doit être utilisé avec précaution chez les sujets ayant des antécédents cardiaques, le bénéfice du traitement doit être pesé,
- Le Minoxidil ne doit pas être appliqué en cas de chute des cheveux brutale, de chute des cheveux consécutive à une maladie ou à un traitement médicamenteux.

Précautions d'emploi

- L'ingestion accidentelle est susceptible d'entraîner des effets indésirables sévères dus à l'action vasodilatatrice du Minoxidil (baisse de la pression artérielle, tachycardie et rétention hydrosodée)
- En cas de contact accidentel avec l'œil, une peau lésée ou une muqueuse, la solution (contenant de l'alcool éthylique) peut provoquer une sensation de brûlure et une irritation : rincer abondamment avec de l'eau courante.
- Ne pas avaler.
- Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.
- Prévenir le médecin en cas de troubles cardiaques.
- Ce médicament nécessite un suivi médical régulier, particulièrement en début de traitement.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Bien que non cliniquement prouvé, on ne peut exclure le risque d'apparition d'une hypotension orthostatique chez les patients traités par ailleurs par des vasodilatateurs périphériques.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre les médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ce médicament doit être évité chez la femme enceinte et allaitante.

D'une façon générale il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

MINOXIDIL 2% and 5%

Solution for local application

DRUG IDENTIFICATION

COMPOSITION :

Minoxidil 2% :

Minoxidil ..... 20 mg

Excipients : propylene glycol, ethyl alcohol, purified water q.s.f.1ml

Minoxidil 5% :

Minoxidil ..... 50 mg

Excipients : propylene glycol, ethyl alcohol, purified water q.s.f.1ml

FORMS AND PRESENTATIONS

- Local solution dosed at 2% of minoxidil :
  - Brown glass flask of 120 ml with a spray and a graduated pipette.
  - 2 brown glass flaskes of 120 ml in casket with a spray and a graduated pipette.
- Local solution dosed at 5 % of minoxidil :
  - Brown glass flask of 120 ml with a spray and a graduated pipette.

PHARMACOTHERAPEUTIC CLASS

Topical anti-alopecia (D: dermatology)

INDICATIONS:

Minoxidil is recommended in cases of moderate hair loss (androgenic alopecia) for adult, men or women. It may favour hair growth by stimulating growth of keratin's cell and stabilizes excessive hair loss.

Minoxidil 5%, a concentrated form, is reserved for patients who doesn't find positive results with Minoxidil 2% after a 4 months treatment.

CAUTION!

CONTRA-INDICATIONS

- Known allergy to minoxidil, propylene glycol or ethanol.
- Subjects under 18 years or above 65 years of age (efficiency and tolerance not yet studied).
- Pathological scalp.
- For Minoxidil 5 %, in case of bad tolerance to the 2 % form whatever the symptomatology.

WARNING AND PRECAUTIONS FOR USE

Warning

- Minoxidil 5% is not recommended for women because the important frequency of hypertrichosis at a distance.
- Minoxidil should be applicated only on normal and healthy scalp: absence of dermatosis or a scalp lesion, or else a systemics effects risk.
- Minoxidil shouldn't be used in case of concomitant application of retinoïc acid, anthraline, or all other irritant topical.
- Dosage and method of administration should be respected or else a systemics effects tied to individual variation or unusual sensitivity can not be excluded (fall of arterial pressure, tachycardia, hydrosodic retention signs, thoracic pain).
- In case of appearance of a systemics effects or a severe dermatologic reactions, the treatment should be interrupted and the doctor prevented.
- Minoxidil should be used with caution among patients who have cardiac antecedents, the benefit of treatment should be considered.
- Minoxidil shouldn't be applicated in case of brutal hair loss and in case of hair loss due to the illness or another treatment.

Precautions for use

- The accidentel ingestion can cause a severe undesirable effects due to the vasodilator action of minoxidil (fall of arterial pressure, tachycardia, and hydrosodic retention).
- In case of accidental contact with eyes, irritated skin, mucous membrane, the solution (contains the ethyl alcohol) can be caused burn and irritation sensation: rinse abandantly with tap water.
- Do not swallow
- Keep out of the reach of children
- Inform your doctor in case of heart disorders.
- This drug requires a regular medical follow up, in particular on starting treatment.

DRUG INTERACTIONS

Although not clinically proved, we can't exclude the risk of appearance of orthostatic hypotension in patients treated by vasodilatators peripherials drugs.

In order to prevent potential interactions between several drugs, inform systematically your doctor or chemist of any other on-going treatment.

PREGNANCY AND LACTATION

This drug is must be avoid during pregnancy and lactation.

مينوكسيديل 2٪ و 5٪

محلول للإستعمال الموضعي

التعريف بالدواء

التركيبة :

مينوكسيديل 2٪ :

مينوكسيديل ..... 20 مغ

السواغ : بروبيلان غليكول، الكحول الأثيلي، ماء نقيّ ..... ك.ك.ل 1 مل

مينوكسيديل 5٪ :

مينوكسيديل ..... 50 مغ

السواغ : بروبيلان غليكول، الكحول الأثيلي، ماء نقيّ ..... ك.ك.ل 1 مل

الشكل الصيدلي :

محلول للإستعمال الموضعي يحتوي على 2٪ مينوكسيديل :

● قارورة ذات 120 مل مع مضخّة وشفّاطة مرقّمة.

● علبة تحتوي على قارورتين ذات 120 مل مع مضخّة وشفّاطة مرقّمة.

محلول للإستعمال الموضعي يحتوي على 5٪ مينوكسيديل :

● قارورة ذات 120 مل مع مضخّة وشفّاطة مرقّمة.

الصنف الدوائي العلاجي :

مضادّ الحاصة – محلّي

(ط : طبّ الجلد)

دواعي الإستعمال :

يستعمل مينوكسيديل في حالة سقوط الشعر المعتدل (الحاصّة المذكاريّة) لدى الكهل، رجل أو مرأة. فيساعد على إنبات الشعر بتنشيط نموّ الخلايا المكوّنة للقراتين ويثبت ظاهرة سقوط الشعر.

مينوكسيديل 5٪، صيغة أكثر تركيزا، مخصّص للمرضى الّذين لم يتحصّلوا على نتيجة إيجابيّة بعد أربع أشهر من العلاج بطريقة سليمة، بمينوكسيديل 2٪.

إنتبه!

مضادّات الإستعمال :

– الأرجيّة المعروفة للمينوكسيديل أو للبروبيلان غليكول أو للكحول الأثيلي.

– الأشخاص الّذين لم يتجاوز سنهم 18 سنة أو الّذين تجاوزوا 65 سنة (فاعليّة الدواء وتحمّله لم يدرسا بعد).

– فروة مرضية.

– لا يستعمل مينوكسيديل 5٪، في حالة سوء تحمّل مينوكسيديل 2٪، مهما كان مبحث الأعراض.

تحذيرات الإستعمال و احتياطاته :

التحذيرات

– مينوكسيديل 5٪ غير منصوح به لدى المرأة وذلك لتداول ظهور قرط الشعار عن بعد.

– يجب عدم إستعمال مينوكسيديل إلاّ على فروة سليمة : عدم وجود جلاد أو آفة في الفروة وإلاّ خطر حدوث تأثيرات مجموعيّة.

– يجب عدم إستعمال مينوكسيديل في حالة الإستعمال المتزامن لحامض الراتينويك أو للأنثرالين أو لأي دواء محلّي مهيّج آخر.

– يجب إحترام المقادير وطريقة الإستعمال نظرا لإمكانية ظهور تأثيرات مجموعيّة مرتبطة بالتغييرات الفرديّة أو الأرجيّة الغير معتادة (إنخفاض الضغط الشرياني، تسرّع القلب، علامات الإنحباس المائي السودي، أوجاع صدريّة).

– يجب إيقاف العلاج وإعلام الطبيب في حالة ظهور تأثيرات مجموعيّة أو تفاعلات جلديّة حادّة.

– يجب إستعمال مينوكسيديل بحذر لدى المرضى الّذين لديهم سوابق أمراض قلبيّة، فلا بدّ من إعادة النظر في فائدة العلاج.

– يجب عدم إستعمال مينوكسيديل في حالة سقوط مفاجئ أو متتال للشعر ناتج عن مرض أو علاج دوائي.

إحتياطات الإستعمال:

– التناول الفموي الغير مقصود لهذا الدواء قد يتسبب في حدوث تأثيرات حادّة غير مرغوب فيها ناتجة عن الفعل الموسّع الوعائي لمينوكسيديل (إنخفاض الضغط الشرياني، تسرّع القلب والإنحباس المائي السودي)

في حالة إتصال الدواء بالعين أو بالجلد المجروح أو بالأغشية المخاطيّة، قد يتسبّب هذا المحلول الّذي يحتوي على الكحول الأثيلي في حدوث شعور بالإحتراق والتهيّج : إغسل بعناية بالماء الجاري.

– لا يشرب.

– لا تترك الدواء في متناول أيدي الأطفال.

– إعلم الطبيب في حالة إضطرابات قلبيّة.

– يتطلّب هذا الدواء متابعة طبيّة منتظمة خاصّة في بداية العلاج.

التداخل بين الأدوية :

بالرغم من أنّه ليس من الثابت صحيّا، فإنّه لا يمكننا إستبعاد خطر ظهور نقص الضغط القيامي لدى المرضى المعالجين في نفس الوقت بالموسّعات الوعائية الحيطيّة.

– حتى نتجنّب التداخل المحتمل بين الأدوية، يجب إبلاغ طبيبك أو الصيدلاني فورا عن كل علاج نتلقاه في نفس الوقت.

الحمل والإرضاع :

لا يجب استعمال هذا الدواء لدى المرأة الحامل والمرضعة.

بصفة عامة، يجب دائما أثناء مدة الحمل أو الإرضاع طلب رأي طبيبك أو الصيدلاني قبل تعاطي أي دواء.

قائمة السواغ ذات مفعول جهير :

– بروبيلان غليكول.

– كحول أثيلي.

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE
- Alcool éthylique
- Propylèneglycol

EFFETS INDESIRABLES
Comme tout produit actif ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :
- Réactions cutanées mineures : irritation locale avec, en particulier desquamations, érythème, dermite, peau sèche, hypertrichose (à distance), sensation de brûlure et prurit.
- Plus rarement, d'autres réactions ont été décrites à type d'allergie (sensibilité, rhinite, éruption, érythème généralisé, œdème de la face), des vertiges, des picotements, céphalées, faiblesse, névrite, altération du goût, infection de l'oreille (en particulier otite externe), troubles de la vision, irritation oculaire.
- Quelques cas d'alopécies, cheveux irréguliers, douleur thoracique, hépatite, lithiase rénale ont été rapportés.

Il faut noter cependant que ces événements médicaux, en particulier ceux qui ont été le plus rarement rapportés, l'ont été sans que l'on puisse établir formellement l'imputabilité du traitement.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
- La dose recommandée est de 1 ml, 2 fois par jour aussi bien pour le Minoxidil 2% que pour le Minoxidil 5%.
- Voie cutanée.
- Appliquer 2 fois par jour une dose de 1 ml sur le cuir chevelu en prenant pour point de départ le centre de la zone à traiter. Cette dose doit être respectée quelle que soit l'étendue de la zone concernée.
- La dose journalière ne doit pas excéder 2 ml.
- Après application de la solution, se laver soigneusement les mains.
- Ne pas appliquer le produit sur une autre partie du corps.
- N'appliquer que sur des cheveux ou un cuir chevelu parfaitement sec.
- Un traitement d'une durée de 4 mois, à raison de 2 applications par jour, peut être nécessaire avant que soit mise en évidence une stimulation de la pousse des cheveux. Le début et le degré de la réponse varient en fonction des sujets, selon certaines observations, un retour à l'état initial apparaîtrait en 3 ou 4 mois en cas d'arrêt du traitement.

Le mode d'application (en cas d'utilisation de pulvérisateur) :
- Dévisser le bouchon extérieur (qui ne sera pas réutilisé).
- Insérer la pompe dans le flacon et visser à fond.
- Diriger le pulvérisateur vers le centre de la surface à traiter, presser une seule fois et étendre la solution avec le bout des doigts de façon à couvrir l'ensemble de la zone à traiter.
- Répéter cette opération 8 fois, pour appliquer la dose requise de 1 ml.
- Eviter d'inhaler le produit, replacer le capuchon extérieur sur la pompe après utilisation.
- En cas d'obturation de la pompe, il est conseillé de rincer celle-ci à l'eau chaude.

Le mode d'application (en cas d'utilisation de pipette) :
- Dévisser le bouchon extérieur.
- Insérer la pipette dans le flacon.
- Prélever 1 ml de la solution de minoxidil.
- Étendre la solution avec le bout des doigts de facon à couvrir l'ensemble de la zone à traiter.
- Rincer la pipette avec de l'eau chaude.
- Refermer le flacon avec le bouchon.

CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
Produit inflammable.
A conserver à l'abri de la chaleur.

AMM N° : 901 317 1 : Minoxidil 2%
: 901 316 3 : Coffret de 2 flacons de Minoxidil 2%
: 901 317 2 : Minoxidil 5%

Liste II : Minoxidil 5 %

CECI EST UN MEDICAMENT
- Un médicament n'est pas un produit comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions n'est pas sans risque.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ainsi que ses contre-indications.
- Ne pas arrêter de votre propre initiative un traitement prescrit.
- Ne pas augmenter ou reprendre le traitement sans avis médical.

NE LAISSER JAMAIS
LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

Version N° 3

Pharmaghreb
Fabriqué et distribué par les Laboratoires PHARMAGHREB
BP 7-1080 Cedex TUNIS Tél. : 71 94 03 00 - Fax : 71 94 03 09

Generally, during pregnancy or lactation, always ask your doctor's or chemist's advice before taking any drug.

LIST OF EXCIPIENTS WITH NOTORIOUS EFFECT
- Ethyl alcohol
- Propylene glycol

UNDESIRABLE EFFECTS
This drug can cause into more or less embarassing effects among some people:
- Minor skin reactions: local irritation, in particular, with desquamation, erythema, dermitis, dry skin, hypertrichosis (at a distance), burning sensation and pruritus.
- More rarely, other reactions have been reported, such as allergy (sensitivity, rhinitis, generalized erythema, face oedema), vertigos, prickling, cephaleas, asthenia, neuritis, taste alteration, ear infection, (in particular external otitis), vision troubles, eye irritation.
- Some cases of alopecia, irregular hair, thoracic pain, hepatitis and nephrolithiasis have been reported.

It should be noted, however, that such medical events, in particular those that have been rarely reported have occurred without formal proof of imputability to this drug.

DOSAGE AND METHOD OF ADMINISTRATION
- The dose recommended is a 1 ml, 2 times a day for Minoxidil 2% as well as Minoxidil 5%;
- Cutaneous tract
- Apply 2 times a day a 1 ml dose on the scalp taking as starting point the center of area to be treated. Such dose should be respected whatever is the size of area to be treated.
- Daily dose should not exceed 2 ml.
- Wash your hands carefully after application.
- Do not apply this drug on other body areas.
- Apply only when hair and scalp are perfectly dry.
- A 4 months treatment at the rate of 2 applications per day can be necessary before noticing a stimulation of hair growth.The beginning and degree of response vary according to people, according to a certain observations, a return to the initial state would appear within 3 to 4 months after treatment stopping.

The method of application (in case of use of a spray) :
- Unscrew the stopper (which will not be re-used)
- Insert the pump into the flask and screw tightly.
- Aim the spray towards the center of area to be treated, press one time and spread the solution using your finger tip so as to cover the whole area to be treated.
- Repeat this operation 8 times so as to apply the required 1 ml dose.
- Avoid inhaling the product, replace the outer cap on the pump after use.
- In case of pump's closing, it's advisable to rinse out this one with a warm water.

The method of application (in case of use of pipette) :
- Unscrew the stopper.
- Insert the pipette into the flask.
- Take 1 ml of the minoxidil solution.
- Spread the solution using your finger tip so as to cover the whole area to be treated.
- Rinse out the pipette with a warm water.
- Close the flask with the stopper.

PARTICULAR CONDITIONS OF CONSERVATION
Inflammable product
To be conserved sheltered from heat.

Drug Authorization : 901 317 1 : Minoxidil 2%
: 901 316 3 : 2 flaskes Casket of Minoxidil 2%

THIS IS A DRUG
- A drug is a product not like other products.
- A drug is a product that acts on your health. Its consumption not in compliance with prescriptions may expose you to a risk.
- Strictly respect your doctor's prescription and recommended instructions for use.
- Follow your chemist's advice.
- Your doctor and your chemist know the drug and its contra-indications.
- Do not stop treatment on your own initiative during the prescribed period.
- Do not increase or begain again the treatment without asking your doctor's advice.

KEEP THE DRUG OUT
OF THE REACH OF CHILDREN

Pharmaghreb
Manufactured and distributed by PHARMAGHREB Laboratories
BP 7-1080 Cedex TUNIS Tél. : 71 94 03 00 - Fax : 71 94 03 09

التأثيرات الغير مرغوب فيها :
ككل مستحضر فعّال، قد يؤدي تناول هذا الدواء لدى بعض الأشخاص إلى حدوث ردود فعل مزعجة بعض الشيء :
– تفاعلات جلدية غير هامّة : تهيّج محلّي، مع خاصّة، توسّف حمامي، إلتهاب الأدمّة، جفاف الجلد، فرط الشّعار (عن بعد)، إحساس بالحرق والحكّة.
– نادرا ما وقع ذكر تفاعلات أخرى من نوع الأرجيّة (حساسيّة، إلتهاب الأنف، طفح، حمامي شامل، وذمة الوجه)، دوار، وخز، صداع، ضعف، إلتهاب عصبي، تغيّر المذاق، تعفّن الأذن (خاصّة إلتهاب الأذن الخارجي)، إضطراب في النظر، تهيّج عيني.
– يمكن أن ينتج بعض حالات من الحاصّة، الشعر الغير منتظم، الآلام الصدرية والتحصّي الكلوي.
يجب الإشارة إلى أنّ هذه التّأثيرات، وخاصّة النّادرة منها، وقعت بدون التأكّد قطعيّا من أنّ المتسبّب فيها هو العلاج.

المقادير وطريقة الاستعمال :
– المقدار المرغوب فيه هو 1 مل مرتين في اليوم لمينوكسيديل 2٪ ومينوكسيديل 5٪.
– سبيل جلدي.
– إستعمل هذا المحلول مرّتين في اليوم بمقدار ملّلتر واحد، وذلك بأخذ مركز المنطقة المعالجة كنقطة إنطلاق. يجب إحترام هذه الكميّة مهما كانت مساحة المنطقة المعنيّة.
– يجب أن لا تتجاوز الكمية اليومية الكاملة 2 ملّلتر.
– يجب غسل اليدين بعناية بعد الإستعمال.
– لا تستعمل هذا الدواء فوق مكان آخر من الجسم.
– لا يستعمل إلا على شعر أو فروة جافّين.
– العلاج الذي يدوم إستعماله 4 أشهر، مرّتين في اليوم، يمكن أن يكون ضروريّ إلى أن يقع التأكّد من عمليّة تنشيط تثبيت الشعر. بداية الإستجابة ودرجتها تختلف من شخص لآخر حسب بعض الملاحظات، الإنقطاع عن العلاج قد يؤدي إلى الرجوع إلى نقطة البداية بعد 3 أو 4 أشهر (الرجوع إلى الوضعية التي كان عليها الشخص عند بداية العلاج).

طريقة الإستعمال (في حالة إستعمال المضخّة):
– إنزع سدّاد القارورة (لا يستعمل مرّة أخرى).
– ضع المضخّة في موقعها داخل القارورة ووثق جيّدا.
– وجه المضخّة نحو وسط المساحة المراد علاجها ثم اضغط مرّة واحدة على المضخّة و ابسط المحلول بأطراف الأصابع على هذه المساحة.
– كرّر هذه العمليّة 8 مرّات لتطبيق كمية 1 ملّيلتر.
– إجتنب استنشاق هذا الدواء وارجع السدّاد على المضخّة بعد الإستعمال.
– من المستحسن غسل المضخّة بالماء السّاخن في حالة إنسدادها.

طريقة الإستعمال (في حالة إستعمال الشفّاطة):
– إنزع سدّاد القارورة.
– ضع الشفّاطة في القارورة.
– خذ 1 مل من محلول مينوكسيديل.
– إبسط المحلول بأطراف الأصابع على المساحة المراد علاجها.
– إغسل الشفّاطة بالماء السّاخن.
– إغلق القارورة بالسدّاد.

شروط خاصة لحفظ الدواء :
سائل سريع الإلتهاب
يحفظ بعيدا عن الحرارة

رقم الترخيص : 1 317 901 : مينوكسيديل 2٪
، 3 316 901 : علبة تحتوي على قارورتين مينوكسيديل 2٪
، 2 317 901 : مينوكسيديل 5٪

قائمة II : مينوكسيديل 5٪

«إنّ هذا دواء»
– الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
– الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
– اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها.
– اتبع نصائح الصيدلي.
– الطبيب والصيدلي هما الخبيران بالدواء وبموانع إستعماله.
– لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
– لاتزد ولاتعد العلاج بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

Pharmaghreb
صنع وتوزيع مخابر الصيدلة المغاربيّة
ص ب – 7 – 1080 تونس الهاتف : 00 03 00 71 94 – الفاكس : 09 03 94 71